

## Rouilles vivant sur des fougères

Marcel Lecomte

Ecidiosores (stade II) pustuleux, hémisphériques, hypophylles, épars ou confluents, enveloppés d'un périidium ou pourvus de paraphyses. Ecidiospores solitaires sur un pédicelle. Téléospores isolées ou groupées dans le mésophylle ou dans les cellules épidermiques, sessiles, paroi mince, hyaline ; d'abord simples, puis à 2 ou 4 loges (cloisons en croix).

<b>1.</b>	Ecidiospores de 2 formes, les unes à paroi mince, les autres à paroi épaisse. Téléospores à 2-4 loges	<b>2.</b>
	Ecidiospores de forme homogène, subglobuleuses ou oblongues, pores germinatifs nuls. Téléospores souvent agglutinées dans les cellules épidermiques, à 2 loges limitées par une cloison verticale	<b><i>Milesina</i></b>
<b>2.</b>	Ecidiospores à pores germinatifs non visibles. Certaines à paroi mince : fusiformes, à apex conique ou mucroné ; d'autres à paroi épaisse : globuleuses ou anguleuses. Téléospores dans le mésophylle	<b><i>Uredinopsis</i></b>
	Ecidiospores à pores germinatifs visibles. Certaines à paroi mince : ovoïdes, à pores germinatifs équatoriaux ; d'autres à paroi épaisse : irrégulières ou anguleuses, à pores germinatifs épars. Téléospores dans les cellules épidermiques	<b><i>Hyalopsora</i></b>