

B231003.1

(Exsicc No c/o FN No)

Bolbitius reticulatus

(Pers.:Fr.) Ricken

Localité L-Wilwerwiltz

Lieu dit Weilerbaach

Coor E/N LA 659 166

Substrat *Carpinus*, *Quercus*

Bois mort très décomposé

Taille CH 2.3 cm

ST 2.5 x 0.2 cm

Insert.LA libres !

Sporée brun moyen-foncé

Saveur non testée

Odeur sans

Réac- -

-chim -

Clef FNp733

BKx-x

LE1-5.3



C°20 H%80

Herbier FN 305

FN B23

Aga-Bol

NB

Chapeau (2,3 cm)

très visqueux après

averses pluviales

Stipe blanc pur

Lames 44 +


lamelles +

lamellules +

macroscopie Clemens M






Boucles non observées



Cutis
Rouge
Congo
SDS x630

Page -1-
de -3-





Cutis
Rouge
Congo
SDS
x1000



Baside



Lame arête
Lame face
non représentée
Pleurocystides
non observées





10 µm




10 µm

Trame




10 µm

Stipe




10 µm




Spores µm
 amy- dex-
 Sporée
 brun foncé




Spores
 H2O
 x1000




10 µm





Oğuzhan Kaygusuz

PhD · Associate Professor at Isparta University of Applied Sciences
Isparta, Turkey



Bolbitis reticulatus. Las Llamargas (Quirós-Asturias), 19-VIII-2017, en madera de *Castanea sativa*. Foto: Enrique Rubio.