

Cortinarius ochroleucoides

Bidaud, Moëgne-Locoz & Reumaux

Jacques GANE
6, rue des jardins sous la fontaine
F-57950 Montigny les Metz

Résumé : l'auteur décrit une espèce de cortinaire rare, trouvé en région Ardennes
Summary : the author describes a variety of cortinarius found in the Ardennes region.
Mots-Clés : Basidiomycota, Cortinarius, Myxacium, Vibratiles, ochroleucus

Récolté en forêt Domaniale de l'Abbé à Trélon, exsic. JGa_0576, le long de la route d'Eppe-Sauvage. Ce spécimen appartient aux Myxacium-Vibratiles pâles à petites spores.

Description macroscopique


Chapeau : 25-50 mm, charnu, sec, convexe s'aplanissant, mamelon en dôme peu marqué, marge enroulée, infléchie ; revêtement légèrement amer, jaune ochracé [RVB210/160/85]]
Lames : 9 mm, larges, assez serrées, émarginées, ocre [RVB210/165/95]], arête concolore
Stipe : 50-60 x 10(15) mm, blanc [RVB215/215/195]], cylindrique, atténué à la base, comme les *duracini*, cortiné, se creusant
Chair : blanchâtre, amertume supportable, légèrement odorante. Saveur légèrement amère
Chimie : non faite.

Habitat : sous feuillus, chênes et charmes.

Étude Microscopique

Exsiccata JGa_0576

Spores : petites ellipsoïdes à subamygdaliformes, ornementation fine, ponctuée
Mesurant 6,5-8,5 x 4-5,5 µm, Q = 1,65



Mesures effectuées avec le logiciel PIXIMÈTRE de Alain HENRIOT et J.L. CHEYPE.

Formule statistique **6,6 [7,5 ; 7,8] 8,7 x 3,9 [4,5 ; 4,8] 5,4 µm**
Q = 1,4 [1,6 ; 1,7] 1,9 ; N = 36 ; C = 95%
Me = 7,65 x 4,63 ; Qe = 1,66

Arête et Cuticule : non faite

Observations et conclusions :

Atlas des Cortinaires pars X sect. Vibratiles : clé 4
« A2 Taxons ne venant pas en aulnaie verte B
B2 Spores elliptiques, parfois courtement mais jamais majoritairement subglobuleuses E
E2 Stipe subcylindrique ou légèrement atténué à la base G

G2 Croissance non typiquement en touffes H
H2 Lames ternes et chair du stipe blanchâtre ou ochracé terne I
M2 Chair de consistance normale, non dure N
N1 Chapeau jaunâtre ochracé à ocre orangé sous un fort voile blanc en glacié. Odeur de miel. Parfois sous les pins. Spores subelliptiques, finement ponctuées, 6-8 x 4-4,5 µm, Q = (1,5) 1,65 (1,8)
..... **C. ochroleucoides** Bid. & al., *sp. nov* (Pl.301-Pl.302, f.470)."



Cooke

Gillet

Ce taxon est le *C. ochroleucus* de Cooke et Gillet.

Bibliographie :

Bidaud & al., 2000, Atl. des Cort. X-1 : pl. 301-302, fiche 470, 479 (clé), 485 (pil., bas., cyst.), 487 (sp.), 492 (DL, T), Cortinarius (Subg. Myx. - Sect. Vibratiles - Série ochroleucus) ochroleucoides (basionyme)

Cailleux A., Code des Couleurs des Sols, édit. Boubée (Cail.).

RVB, Code des Couleurs numériques Rouge-Vert-Bleu (RVB).

Séguy, Code Universel des Couleurs, Éditions Lechevalier (Ség.).

Henriot A., Piximètre, Logiciel de mesure de dimensions sur images, ach.log.free.fr/piximètre.



JGa_0576

Récolté en forêt domaniale de l'Abbé,
à Trélon (59), alt. 220 m, sous feuillus,
chênes et charmes.

Cortinarius ochroleucoides Bidaud, Moëgne-Loccoz & Reumaux