

Cortinarius bataillei (Moser) Høiland

Jacques GANE
6, rue des jardins sous la fontaine
F-57950 Montigny les Metz

Résumé : l'auteur décrit une espèce de cortinaire rare, trouvé en région Atlantique

Summary : the author describes a variety of cortinarius found in the Atlantic region.

Mots-Clés : Basidiomycota, Cortinarius, Dermocybe,

Récolté le 11/11/2014, aux Journées Mycologique de l'Estuaire à Piriac (44), JGa_1465, en forêt de Pen Bron. Ce dermocybe attire l'attention par la base de son pied tachée d'orange et ses lames jaune moutarde...

Description macroscopique

Chapeau : 45-70 mm, campanulé puis aplani à mamelon bas, lisse à légèrement furfuracé, brun jaune foncé [RVB90/40/30], marge plus claire [RVB160/90/35].

Lames : serrées, échancrées, jaune moutarde [RVB120/70/10], arête érodée, plus claire [RVB195/145/75].

Stipe : 90-105 x 5-8 (10-15) mm, assez grêle à élancé, subégal, un voile brun-gris à brun-olivacé [RVB115/65/10] chinant sur un fond jaune d'or à ochracé [RVB195/145/75], la base et le mycélium fortement orangé feu [RVB175/70/55].

Chair : jaune, orangé à la base du pied, odeur un peu raphanoïde.

Chimie : non faite.


Habitat : conifères, Pinus pinaster...

Étude Microscopique

Exsiccata JGa_1465 :

Spores : ellipsoïdales à ovoïdes, ornementation fine à moyenne, verrues saillantes

Mesurant (6,5) 7-8,5 (9,5) x 4,5-5,5 µm, Q = 1,6, stat. 6,5-9 x 4,5-5,5 µ



Mesures effectuées avec le logiciel PIXIMETRE de Alain HENRIOT et J.L. CHEYPE.

(6,3) 6,9 - 8,6 (9,4) x (4,4) 4,7 - 5,4 (5,5) µm

Q = (1,2) 1,4 - 1,7 (2) ; N = 61

Me = 7,8 x 5 µm ; Qe = 1,6

Arête Cuticule : non faite

6,5 [7,6 ; 7,9] 9 x 4,5 [4,9 ; 5,1] 5,6 µm

Q = 1,3 [1,5 ; 1,6] 1,8 ; N = 61 ; C = 95%

Me = 7,8 x 5 µm ; Qe = 1,6

Discussion et conclusions :

Clé des "dermocybe" de Béran :

Voile sur le pied d'un grisâtre à brunâtre olivacé sous forme de ceintures incomplètes en zigzag, parfois assez marquées.
 Pied à la base (tomentum mycélien, cortex, parfois aussi chair) *orange vif*. Lames *jaune moutarde*, plus pâles sur l'arête, souvent denticulées. Chapeau brun roux ; le fond jaunâtre ressort vers la marge là où des écailles fibrilleuses sont plus écartées. *C. bataillei*

Remarquable par ce *chevelu grisâtre brun olive* couvrant tous le pied sous la ligne de cortine et cette *base orange-feu*.

Synonyme : *C. fucatocephalus* Fries E.M. ss. Bataille 1911 (non ss. Lasch = *C. croceus* (Shaeffer : Fries) Hoiland 1983, sec. Konrad & Maublanc 1932, I.S.F. : 147)

Bibliographie :

Brandrud & al., 1994, CFP 3, C 18, Cort. (Subg. Cortinarius - Sect. 7 Dermocybe) bataillei

Eyssartier & Roux, 2011, Guide des champignons : 784, *C. bataillei*

Høiland, 1983 (1984), *Opera botanica*, n. 71 : 86, *cortinarius* (Derm.) *bataillei* (Favre ex Moser) (c. val.)

Moser, 1976, *Bull. suisse*, 54, n. 10 (Oct.) : 147 (DL, T), *dermocybe bataillei* Favre ex Moser (basionyme)

Soop, 2008, *Cortinarius in Sweden* : VI (clé), 4 (d), *C. bataillei*

Tartarat, 1988, *Fl. an. Cort.* : 25, *C. bataillei*

Cailleux A., *Code des Couleurs des Sols*, édit. Boubée (Cail.).

RVB, *Code des Couleurs numériques Rouge-Vert-Bleu* (RVB).

Séguy, *Code Universel des Couleurs*, Éditions Lechevalier (Ség.).

Henriot A., *Piximètre*, Logiciel de mesure de dimensions sur images, ach.log.free.fr/piximetre.

