

## *Cortinarius brunneus* (Persoon) Fries

Jacques GANE  
6, rue des jardins sous la fontaine  
F-57950 Montigny les Metz

Résumé : l'auteur décrit une espèce de cortinaire rare, trouvé en région Wallonie.

Summary : the author describes a variety of cortinarius found in the Wallonia. region.

Mots-Clés : Basidiomycota, cortinarius, telamonia, brunnei, brunneus

Récolté aux Journées mycologiques d'été de Neufchâteau (B), à Straimont (les Foulouzes) en Province du Luxembourg, 2014, exsic. JGa\_1406. Déjà trouvé dans la même région et dans les Vosges en 2005 et 2011, JGa\_1197.

### Description macroscopique

**Chapeau** : 20-30 →60 mm, campanulé à mamelon marqué, légèrement fibrilleux, marge érodée, infléchie ; revêtement brun noir [RVB75/55/45] à brun clair [RVB165/135/105] vers la marge, marginelle grisâtre [RVB195/160/140]

**Lames** : larges, très espacées, ventruées, sinuées, émarginées-uncinées, arête entière, concolore

**Stipe** : 75-105 x 7-12(→30) mm, clavé, vergeté de chinure brune, sommet violeté [RVB95/80/70], voile en anneau épais, gris brunâtre [RVB170/125/95], base gainée de mycélium blanc [RVB215/200/195]

**Chair** : beige brunâtre, base plus foncée, odeur subraphanoïde.

Chimie : non faite.


Habitat : picea abies

### Étude Microscopique

Exsiccata JGa\_1406

**Spores** : ovoïdes à subglobuleuses, ornementation fine à moyenne, légèrement saillante à l'apex, subcaténulée.

Mesurant 8-9 (10) x 5,5-6,5 (7) µm, Q = 1,4, stat. 8-9,5 x 5,5-7 µ



Mesures effectuées avec le logiciel PIXIMÈTRE de Alain HENRIOT et J.L. CHEYPE.

8 [8,7 ; 8,9] 9,6 x 5,6 [6,1 ; 6,3] 6,8 µm

Q = 1,2 [1,4] 1,6 ; N = 56 ; C = 95%

Me = 8,8 x 6,2 µm ; Qe = 1,4

(7,8) 8,2 - 9,2 (10) x (5,6) 5,9 - 6,6 (7,1) µm

Q = (1,3) 1,31 - 1,5 (1,6) ; N = 56

Me = 8,8 x 6,2 µm ; Qe = 1,4


**Arête** : non faite

**Cuticule** : non faite

### Observations et conclusions :

Autre récolte, des Vosges (88) :

Exsiccata JGa\_1197 : Mesurant (8) 8,5-10 (10,5) x (6) 6,5-7 (8)  $\mu\text{m}$ , Q = 1,4, moy. 8,5-10,5 x 6-7,5  $\mu\text{m}$



Nous avons récolté en Belgique, des brunnei moins brun, plus ocré, une forme ou variété ? L'Atlas nous propose un *C. brunneofulvus*..., je n'ai pas gardé d'exsiccata !



### Bibliographie :

**Bidaud & al.**, Atl. des Cort., XVIII (1), pl. 705-708-709-710-714, fiche 950 : 1274 à 1276 (commentaire), 1279 (sp.), 1282 (clé, brunneus ss. Cooke = disjungendus), 1282 (brunneus ss. Rick., Lange, K.M., non ss. Fries, = subbrunneus var. subbrunneus), 1282 (brunneus var. brunneus), 1298 (clé), Cort. (Ss.G. Telamonia, Section Brunnei, Série brunneus, Stirps brunneus) brunneus

**Brandrud & al.**, 1992, CFP 2, B07 + Livret : 3 (n), 10 (d. néotype), 42 (n), Cort. (Subg. Tel. - Sect.2 Brunnei)

**Breitenbach & Kr.**, 2000, Champ. de Suisse 5 : 242, Pl.302, C. (Tel.)

**Consiglio & al.**, 2004, Il genere Cortinarius in Italia II, B29, C.

**Fries, 1838, Epicr., 298, cortinarius (Tel.) brunneus (comb. val.)**

**Marchand**, 1983, Champ. N. et Midi, 8 : 788, C. (Tel.)

**Persoon, 1801, Syn. meth. Fung. : 274 n°26, agaricus brunneus (basionyme)**

**Soop**, 2008, Cortinarius in Sweden : XVII (clé), 66 (n), 67 (n), 28 (n), 72 (n), 77 (d), 79 (n), 87 (n),

**Tartarat**, 1988, Fl. an. Cort. : 183, C. (Tel.) brunneus

**Cailleux A.**, Code des Couleurs des Sols, édit. Boubée (Cail.).

**RVB**, Code des Couleurs numériques Rouge-Vert-Bleu (RVB).

**Séguy**, Code Universel des Couleurs, Éditions Lechevalier (Ség.).

**Henriot A.**, Piximètre, Logiciel de mesure de dimensions sur images, ach.log.free.fr/piximètre.



Récolté aux J.M. d'été  
de Neufchâteau (B) à,  
Straimont (les Foulouzes),  
sous picea abies.

*JGane*

JGa\_1406

**Cortinarius brunneus** Fries