

Cortinarius malleatus Bidaud & Fillion

Jacques GANE
6, rue des jardins sous la fontaine
F-57950 Montigny les Metz
jacques.gane@orange.fr

Résumé : l'auteur décrit une espèce de cortinaire rare, trouvé en région Lorraine

Summary : the author describes a variety of cortinarius found in the Lorraine region.

Mots-Clés : Basidiomycota, cortinarius, phlegmacium, multifformes, polymorphus.

Trouvés par Albert Grobelny, le 1/09/2007, exsic. JGa_0720a, en forêt communale d'Arraincourt (F-57380), à l'entrée, 260 m, sous un bosquet d'épicéas, de bouleaux et de charmes.

Description macroscopique

Chapeau : 60-75 → 80 mm, convexe, bosselé, large mamelon en dôme, marge ondulée, trace de voile blanc sur le chapeau [RVB220/210/205], cuticule mate, fauve orangé [RVB135/45/5 à 240/175/90].

Lames : assez étroites, serrées, adnées, beige clair [RVB175/135/100], arête érodée, blanchâtre [RVB245/225/195].

Stipe : 60 x 12-15(20-27) mm, blanc [RVB230/220/205], assez court à gros bulbe se tachant de jaune [RVB225/180/115], submarginé, arrondi au bord, qui est incliné, s'évasant sous les lames, fibrilleux, fibrilles rousses, cortine ténue à peu abondante.

Chair : blanche, ferme, odeur agréable.

Chimie non faite...


Habitat : semble rare, trouvé sur un terrain neutre à tendance calcaire, sous feuillus, bouleaux et charmes mêlés d'épicéas.

Étude Microscopique

Exsiccata JGa_0720a :

Spores : amygdaliformes à sommet pointu, souvent papillé, ornementation fine, ponctuée.

Mesurant 9-11 x 5,5-6,5 µm, Q = 1,7



Mesures effectuées avec le logiciel PIXIMETRE de Alain HENRIOT et J.L. CHEYPE.

Formule statistique :

8,8 [9,8 ; 10,2] 11,2 x 5,4 [5,9 ; 6,1] 6,6 µm
Q = 1,5 [1,6 ; 1,7] 1,9 ; N = 51 ; C = 95%
Me = 10 x 6 ; Qe = 1,7

Arête : non faite

Cuticule : non faite

Observations et conclusions :

Ce taxon des feuillus, de taille moyenne, d'odeur agréable, possède des spores citriniformes typique de la série polymorphus, il semble rare et se reconnaît par son chapeau bosselé et son bulbe marginé, à bord incliné comme polymorphus.

Bibliographie :

Bidaud & al., 2006, Atl. des Cort. XVI, Pl. 615-616, Fiche 795 bis ; Livret XVI : 1084 (clé), 1085 (n), 1086 (sp.), Cort. (Subg. Phl. - Sect. Multifformes - Série polymorphus - Stirps polymorphus) malleatus
Bidaud & Fillion, 1998, Bull. FMDS 149 (Avril), : 31 (d, DL), 32 (T), 33-34 (d), cortinarius (Phl.) malleatus (Basionyme)

Cailleux A., Code des Couleurs des Sols, édit. Boubée (Cail.).

RVB, Code des Couleurs numériques Rouge-Vert-Bleu (RVB).

Séguy, Code Universel des Couleurs, Éditions Lechevalier (Ség.).

Henriot A., Piximètre, Logiciel de mesure de dimensions sur images, ach.log.free.fr/piximètre.



Cortinarius malleatus Bid. & Fillion