

Cortinarius phoeniceus (Bulliard) Maire

Jacques GANE
6, rue des jardins sous la fontaine
F-57950 Montigny les Metz

Résumé : l'auteur décrit une espèce de cortinaire rare, trouvé en région Wallonne et Lorraine

Summary : the author describes a variety of cortinarius found in the Wallonia et Lorraine region.

Mots-Clés : Basidiomycota, cortinarius, Dermocybe, Sanguinei, Phoeniceus.

Récoltés le 04/09/2006 dans les Vosges, par mon ami Albert Grobelny, exsic. JGa_0618. Récupéré, quelques jours auparavant, aux JM d'été de Neufchâteau (B) JGa_0608. Ce beau dermocybe éclatant de rouge fait partie des "sanguins"...

Description macroscopique

Chapeau : 20-35 (50) mm, conique campanulé convexe puis plan, à mamelon obtus, marge infléchie ; revêtement sec, feutré méchuleux, brun rouge à purpurin [RVB150/75/30■ à 100/55/55■], uniforme.

Lames : 6 mm, assez espacées, arrondies au pied, rouge sang [RVB140/35/20■], arête érodée plus pâle.

Stipe : 45-70 x 6-10 mm, subégal à voile engainant carmin [RVB165/65/30■] sur fond jaune doré [RVB195/165/100■].

Chair : ocracée [RVB175/135/90■], gris verdâtre [RVB115/85/65■] dans la moelle, le sommet et le cortex du stipe, odeur terreuse.

Chimie : non faite.


Habitat : conifères sur grès rose, acide

Étude Microscopique

Exsiccata JGa_0618 :

Spores : petites, ellipsoïdales, ornementation très fine, sablée, imperceptible.

Mesurant 6-7,5 (8,5) x (3,5) 4-4,5 (5) μm , Q = 1,6, stat. 6-8 x 3,5-4,5 μ



Mesures effectuées avec le logiciel PIXIMÈTRE de Alain HENRIOT et J.L. CHEYPE.

Arête : non faite

Cuticule : non faite

Observations et conclusions

Certains mycologues synonymisent *C. phoeniceus* avec *C. purpureus* (du même Bulliard ?), contrairement aux auteurs de l'Atlas des Cortinaires qui décrivent *C. purpureus* (pl. 132, f. 242) comme un


dermocyste poussant sur des souches en décomposition dans un bois mixte de Pinus sylvestris, Fagus sylvatica et Quercus sp. de Haute-Savoie (600 m)

Atlas Pars VI, Dermocyste, Clé de la Section Sanguinei :

"A2 Espèces non entièrement rouge-pourpre ou rouge sang Série phoeniceus
A1 Espèces à chapeau rougeâtre, purpurin ou pourpre-noir B
B1 Voile rouge-pourpre sous forme de fibrilles ou de bracelets C
C1 Espèce venant sous feuillus (souvent sous châtaigniers) et sous conifères, en terrain acide
..... C. phoeniceus R. Maire var. phoeniceus (Pl.130, f.240)"

Autre récolte de Belgique :

Exsic. JGa_0608 : Mesurant 6-7,5 x 3,5-4,5 µm, Q = 1,8



Bibliographie :

Bidaud & al., 1994, Atl. Cort. VI, Pl. 130, Fiche 240 + Livret 6 : 164 (clé), 167 (N, série phoeniceus, cf. note 3), 168 (fig.6, sp), C. [Subg. Dermocyste - Sect.3 Sanguinei - Série phoeniceus) phoeniceus

Brandrud & al., 1994, CFP 3, Livret 3 : 13-15 (discussion nomenclaturale: cf. ci-dessus en Iconographie et note 2)

Breitenbach & Kr., 2000, Champ.de Suisse, 5, Pl. 161 sub C. purpureus, C. (Derm.), (= phoeniceus, selon Breitenbach & Kr.)

Bulliard, 1793, Herbar de France : T. 598 f.1, agaric pourpré (Planche indiquée sous ce nom, mais non sous le nom de Agaricus phoeniceus) cf. notes 1 et 2 + Biblio à Ventenat

Consiglio & al. 2004, Il genere Cortinarius in Italia I, A 121

Eyssartier & Roux, 2011, Guide des champignons : 786

Henry, 1935, SMF 51 (3-4) (paru 1936) : 333, C. (Derm.) phoeniceus

Maire, 1911, SMF 27-4 : 434, cortinarius phoeniceus (comb. val.) cf. notes 1 et 2

Marchand, 1982, Champ. N. et Midi 7 : 614, Derm. phoenicea

Soop, 2008, Cortinarius in Sweden : VI (clé), 7 (d), C. (Ss.g. Derm.- Sect. Sanguinei) phoeniceus (serait syn. non prioritaire de purpureus)

Tartarat, 1988, Fl. an. Cort. : 21, - id. -

Ventenat, 1809-1812, Suite à Bulliard, Hist. des champignons de France II (2) : 647, agaricus phoeniceus (cf. note 2)

Cailleux A., Code des Couleurs des Sols, édit. Boubée (Cail.).

RVB, Code des Couleurs numériques Rouge-Vert-Bleu (RVB).

Séguy, Code Universel des Couleurs, Éditions Lechevalier (Ség.).

Henriot A., Piximètre, Logiciel de mesure de dimensions sur images, ach.log.free.fr/piximètre.



Jéane

JGa_0618

Récolté par A. Grobelny,
le 02/09/2006,
à Pierre-Percée (88),
sous conifères,
sur grès rose vosgien.

Cortinarius phoeniceus (Bulliard) Maire