

Cortinarius reverendissimus Bidaud, Moëgne-Locoz & Reumaux.

Jacques GANE
6, rue des jardins sous la fontaine
F-57950 Montigny les Metz
jacques.gane@orange.fr

Résumé : l'auteur décrit une espèce de cortinaire rare, trouvé en région Franche-Comté

Summary : the author describes a variety of cortinarius found in the Franche-Comté region.

Mots-Clés : Basidiomycota, cortinarius, phlegmacium, varius.

Récoltés le 25/09/2009, aux alentours d'Éternoz (25), dans les forêts de conifères, exsic. JGa_0917. Représenté par Paul Hertzog aux journées mycologiques de la SMS, à Lucelle en 2010, en provenance de Suisse... Cette espèce caractéristique : bolétoïde à pied pointu et à lames bleutées, se reconnaît assez facilement...

Description macroscopique

Chapeau : 45 → 60 mm, hémisphérique puis convexe-plan, marge très enroulée ; revêtement vite sec, roussâtre orangé [RVB145/55/25] , parsemé de flocons de voile blanc, marginelle jaune très pâle [RVB180/160/115] à blanchâtre.

Lames : 3 mm, serrées, étroites, falquées, adnées, bleuté [RVB160/175/185] rosâtre, arête ± entière.

Stipe : 60-95 x 25-30 (40-45) mm, fusoïde, chaussé d'un voile blanc cotonneux assez hirsute, s'occrassant [RVB190/145/80] , sommet et cortine blanche [RVB205/205/200]

Chair : ocre [RVB185/145/65] dans le chapeau, blanche [RVB195/205/180] ailleurs, odeur non perçue.

Chimie : KOH + chair jaune d'or...


Habitat : conifères sur calcaire, épicéas et sapins blancs.

Étude Microscopique

Exsiccata JGa_0917 :

Spores : elliptico-amygdaliformes, ornementation confuse, peu nette...

Mesurant (6) 6,5-9,5 (11) x (3,5) 4-5,5 (6) μm , $Q_e = 1,7$, 5,5-9,5 x 3,5-5,5 μm



Mesures effectuées avec le logiciel PIXIMETRE de Alain HENRIOT et J.L. CHEYPE.

5,5 [7,3 ; 7,9] 9,7 x 3,4 [4,4 ; 4,7] 5,6 μm

Q = 1,4 [1,6 ; 1,7] 2 ; N = 58 ; C = 95%

$\sigma_{xy} = 1 \times 0,6$

(6) 6,6 - 9,3 (10,9) x (3,7) 3,9 - 5,5 (6,1) μm

Q = (1,3) 1,5 - 1,9 (2) ; N = 58

Me = 7,6 x 4,5 μm ; $Q_e = 1,7$

Arête : non faite

Cuticule : non faite

Observations et conclusions

On le classerait facilement dans les multiformes, avec les restes de voile sur le chapeau... C'est le claricolor de Ricken.

Voyons les clés de l'Atlas : section et sous-section phlegmacium...

B2 Voile *apprimé* laissant une ou plusieurs lignes annulaires. Lames violettes ou *lilacines*. Spores elliptiques ou amygdaliformes
..... **Série varius** Bid. & al. *ser. nov.*

A1 Réaction positive à KOH : *jaune d'or*, jaune orangé, jaune roux..... **Stirps varius** Bid. & al. *stirps nov*

D2 Voile fortement *développé* laissant des *bracelets étages* sur le stipe et des plaques membraneuses sur le chapeau (aspect de *C. claricolor* var. *immissus*). Hêtraie-sapinière calcaire ou basaltique. Spores largement elliptiques, 8,5-11,5 x 6-6,5 µm..... **C. reverendissimus** Bid. & al. *sp. nov.* (Pl.211, f.356)

[= *C. claricolor* (Fr.) Fr. ss. Ricken 1915, non ss. Fries 1838]

Bibliographie :

Bidaud & al., 1999, Atl. des Cort. IX-1, pl. 211, f. 356, :311 (clé), 339 et 340 (sp.), 373 (DL, t), cortinarius (Subg. Phl. - Sect. Phl. - Subsect. Phl. - Série varius - St. varius) reverendissimus (basionyme).

Consiglio, 2001, Rivista di Micol.n°44-4 (Oct-Déc), : 311-336 C. reverendissimus.

Consiglio & al., 2004, Il genere Cortinarius in Italia, II, B 133 C. reverendissimus.

Eyssartier & Roux, 2011, Guide des champignons : 768 C. reverendissimus.

Cailleux A., Code des Couleurs des Sols, édit. Boubée (Cail.).

RVB, Code des Couleurs numériques Rouge-Vert-Bleu (RVB).

Séguy, Code Universel des Couleurs, Éditions Lechevalier (Ség.).

Henriot A., Piximètre, Logiciel de mesure de dimensions sur images, ach.log.free.fr/piximètre.



10 mm

JGa_0917

Trouvés à Eternoz (Doubs)
500 m, sous conifères



JGane

Cortinarius reverendissimus Bid. & al.