



***Golovinomyces monardae* sur *Mentha aquatica*.** 30/07/2026 – Perk – Belgium  
Fiche conçue et réalisée par Daniel Deschuyteneer



Ce champignon s'attaque principalement aux membres de la famille des *Lamiaceae* (famille de la menthe).

Initialement décrit sous le nom d'*Erysiphe monardae* en 1977 par G.S. Nagy, il a longtemps été confondu ou regroupé au sein du complexe d'espèces *Golovinomyces biocellatus*.

En 2016, des études phylogénétiques et morphologiques approfondies menées par Scholler et ses collaborateurs ont officiellement séparé *Golovinomyces monardae* afin de distinguer sa spécificité d'hôte et ses caractéristiques génétiques.

### **Plantes hôtes principales**

Bien que son nom fasse référence à la monarde, ce champignon est étroitement polyphage au sein des plantes aromatiques.

Le genre *Monarda* : très fréquent sur la monarde écarlate (*Monarda didyma*) et la monarde sauvage (*Monarda fistulosa*).

Le genre *Mentha* : il affecte de nombreuses variétés de menthes comme la menthe aquatique (*Mentha aquatica*), la menthe poivrée (*Mentha x piperita*), ou la menthe verte (*Mentha spicata*).

Autres lamiacées : on le retrouve aussi parfois sur le romarin (*Rosmarinus officinalis*), l'origan (*Origanum vulgare*), la mélisse, ou des espèces d'agastaches (*Agastache mexicana*).

