



Tranzschelia discolor (Fuckel) sur ***Prunus domestica*** - 21/09/2025 - Jardin à Zaventem - Belgium
Fiche conçue et réalisée par Daniel Deschuyteneer



Urédospores épineuses, de forme inhabituelle et de dimensions variables, dont l'apex est épaissi, mesurant pour N = 20 :
(25,5)27,8-**31,1**-35(39,7) × (15,7)16,5-**18,2**-19,3 (20,2) μm.




Téleutospores, biloculées, à grosses épines, mesurant pour N = 20 :
(30,8)32,2-**36,4**-40,5(42,3) × (16,8)18,6-**21,4**-23,3(25,6) µm.






COMPARAISON

<i>Tranzschelia pruni-spinosae</i>	<i>Tranzschelia discolor</i>
S II : paraphyses (2,5-)3,5-6,5(-7) μm	S II : paraphyses (1,5-) 2,5-4,5(-5) μm
Téleutospores non fasciculées (non issues d'une cellule unique)	Téleutospores fasciculées
Mesures : 30-45 x 10-20 μm	Mesures : 30-43 x 20-25 μm
Locule supérieur sphérique, épaissi au sommet ; locule inférieur ellipsoïde, presque lisse, plus clair que l'autre, épaissi au niveau des parois latérales	Les deux locules sont sphériques, non épaissis
Hôte principal : <i>Prunus spinosa</i>	Hôte principal : <i>Prunus spinosa</i>



Téleutospores disposées en faisceau, naissant d'une cellule basale unique



Paraphyses hyalines à sommet dilaté.

