

NOM	<i>Uromyces ficariae</i> (Schum.) Lev. 1860	
Synonymes	<i>Uredo ficariae</i> Schum.	
Hôte A	<i>Ranunculus ficaria</i> L. Ficaire fausse renoncule Espèce autoxène ; S I absent	
stade II	urédies (sores)	Exceptionnel en même temps que les télies
	urédospores	18-32 x 17-25 µm ; 3 pores germinatifs
stade III	Télies (sores)	Punctiformes, petites, peu groupées, pulvérulentes
	téleutospores	22-37 x 18-22 (16-36) µm
Récoltes :	Bruxelles (B-1000), 09/04/2006 leg. Daniel DESCHUYTENEER	



Plante en fleur



Détail de la fleur (photo M. Lecomte)



Taches sur les feuilles indiquant la présence de télies épiphylls (photo M.Lecomte)



Sores à téléutospores, foliicoles, épiphylls, roux à brunâtre clair, compacts et nettement pulvérulents (photo M.Lecomte)



Sores à téléospores, hypophylles, roux à brunâtre clair, compacts et nettement pulvérulents



Téleospores non colorées (photo A. Vanderweyen)



Téleospores observées dans le rouge Congo SDS



Téleospores : multiplicité des formes



Téleospores avec ébauche de pédicelle

Toutes les photos (sauf mention contraire) ont été réalisées par Daniel DESCHUYTENEER